

Übungen zu Theoretische Physik II - Quantenmechanik I
Blatt 7 (abzugeben am 10. Juni)

Aufgabe 1 Harmonischer Oszillator in 3d in Kugelkoordinaten (10 Punkte)

Wir betrachten den harmonischen Oszillator in drei Dimensionen in Kugelkoordinaten:

$$\tilde{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\vec{\nabla}^2 + \frac{1}{2}\mu\omega^2 r^2. \quad (1)$$

a) Machen Sie einen Separationsansatz

$$\psi_{Elm}(r, \theta, \varphi) = \frac{U_{El}(r)}{r} Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (2)$$

und finden Sie die Radialgleichung für U_{El} .

b) Welche Terme dominieren für $r \rightarrow \infty$? Zeigen Sie, dass $U \propto e^{-y^2/2}$ mit $y = \sqrt{\mu\omega/\hbar}r$ die Radialgleichung asymptotisch für $r \rightarrow \infty$ löst.

c) Machen Sie den Ansatz $U(y) = v(y)e^{-y^2/2}$ und definieren Sie $\varepsilon \equiv 2E/(\hbar\omega)$. Finden Sie die Differentialgleichung für v .

d) Machen Sie den Ansatz

$$v(y) = y^{l+1} \sum_{i=0}^{\infty} C_i y^i \quad (3)$$

und finden Sie eine Rekursionsrelation der C_i .

e) Die Potenzreihe muss, wie beim 1d harmonischen Oszillator, abbrechen. Was folgt für die Energieniveaus? Setzen Sie die Hauptquantenzahl n aus der Vorlesung zu l in Beziehung.

Aufgabe 2 Runge-Lenz Vektor (10 Punkte)

Zeigen Sie, dass für den quantenmechanischen Runge-Lenz Vektor

$$\tilde{N}_i \equiv \frac{1}{2\mu} \varepsilon_{ijk} (\tilde{p}_j \tilde{L}_k + \tilde{L}_k \tilde{p}_j) - \frac{e^2 x_i}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{1/2}} \quad (4)$$

mit

$$\tilde{p}_j = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j}, \quad (5)$$

$$\tilde{L}_k = \varepsilon_{klm} x_l \tilde{p}_m \quad (6)$$

und den Hamiltonoperator

$$\tilde{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \vec{\nabla}^2 - \frac{e^2}{r}. \quad (7)$$

des Wasserstoffatoms gilt

$$[\tilde{H}, \tilde{N}_i] = 0. \quad (8)$$